

โรคไข้เลือดออก



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
KASEMRAD INTERNATIONAL
HOSPITAL

โรคไข้เลือดออก



โรคไข้เลือดออก เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี
มีอยู่หลายเป็นพาหะนำโรค พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่

อาการ

- 

ไข้สูงเฉียบพลัน
เบื่ออาหาร หน้าแดง
ปวดศีรษะ อาเจียน
- 

มีผื่น จุดสีแดง
ขึ้นตามลำตัว แขน ขา
หรือตามข้อต่อกระดูก
- 

มีภาวะช็อคช่วงไข้ลด
มือเท้าเย็น ชีพจรเบาเร็ว
- 

ตับโต มักกดเจ็บ
บริเวณชายโครงขวา

การรักษา



ให้ยาลดไข้ "พาราเซตามอล"

ห้ามใช้ยาแอสไพริน



พยายามดื่มน้ำมากๆ
หรือดื่มเกลือแร่แทนน้ำเปล่า



ถ้ามีอาการปวดท้อง ชีบลงกระสับกระส่าย
มือเท้าเย็นไข้ลด ให้รีบนำส่ง sw. ทันที

การป้องกัน



1. หากมีอาการ
นำส่งสัควรรีบ
พบแพทย์



2. ป้องกันยุงกัด นอนในมุ้ง
หรือติดมุ้งลวด ในบ้าน และกายา
กันยุง



3. ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
กำจัดภาชนะที่มีน้ำขัง
ใช้ทรายกำจัดลูกน้ำ
และปรับปรุงภูมิทัศน์

ข้อมูลจาก : กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค

แบบฟอร์มการสร้างแบบทดสอบประเมินความฉลาดรู้ด้านการอ่าน

สาระน่ารู้...สถานการณ์ไข้เลือดออก,, โรคไข้เลือดออกที่พบในไทยเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี และมีุงลายเป็นพาหะของโรค พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่

คาดว่าปี 2565 จะมีการระบาดเพิ่มขึ้น จำนวนผู้ป่วยคาดว่าจะมีประมาณ 85,000 ราย ด้วย 2-3 เหตุผล คือ ปกติไข้เลือดออกจะระบาดปีเว้นปีหรือปีเว้น 2 ปี

ตอนนี้วงจรการระบาดรอบใหม่ เนื่องจาก 2 ปีที่ผ่านมาผู้ติดเชื้อน้อย ภูมิคุ้มกันจึงมีน้อย และมีกิจกรรมทางสังคมเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าจะมีผู้ป่วยสูงสุด

ช่วง มิ.ย. - ส.ค. และ ก.ค.คาดว่าจะมีผู้ป่วยมากที่สุด 13,769 ราย

ไข้เลือดออกโรคร้ายที่มีุงลายเป็นพาหะ

อาการ

1. ไข้สูงลอย 39-40 องศา ปวดเมื่อยตามตัว ปวดศีรษะประมาณ 4-5 วัน
2. อาการเลือดออก ถ่ายดำ อาเจียน มีจุดเลือดออกตามตัว
3. ตับโต กดแล้วเจ็บบริเวณชายโครงด้านขวา
4. ระบบไหลเวียนเลือดผิดปกติ หรืออาการช็อก เกิดในช่วงไข้ลด กระสับกระส่าย มือเท้าเย็น รอบปากเขียว ชีพจรเบาและเร็ว ความดันต่ำ

การรักษา

1. ให้ยาลดไข้ ยาลดไข้ที่ควรใช้คือพาราเซตามอล
2. ให้สารน้ำชดเชย ในรายที่ขาดน้ำมาก
3. ดูแลการอย่างใกล้ชิด ถ้าผู้ป่วยมีอาการกระสับกระส่าย มือเท้าเย็น คลื่นไส้ อาเจียน ใจสั่น หน้ามืด ในช่วงไข้ลดให้รีบนำส่งรพ.ทันที
4. ตรวจเกล็ดเลือดและความเข้มข้นเลือด เพื่อใช้พิจารณาในการให้สารน้ำชดเชย

การป้องกัน

1. ควบคุมสิ่งแวดล้อมเพื่อไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ของุงลาย
2. ป้องกันส่วนบุคคล ใส่เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว
3. ใช้สารเคมีควบคุม ใช้ทรายอะเบท ใช้ยาฆ่าลูกน้ำใส่ในบ่อน้ำ ใช้สารเคมีพ่นตามบ้านเพื่อฆ่าุงลาย

ข้อมูลจาก

https://www.kasemrad.co.th/aranyaprathet/th/site/health_articles/detail/788

คำถามที่ 1 แบบเลือกตอบ (อย่างน้อย 1 คำถาม)

ข้อใดไม่ใช่อาการของโรคไข้เลือดออก

1. ไข้สูงลอย 39-40 องศา
2. ถ่ายดำ
3. จมูกไม่ได้กลิ่น
4. อาเจียน
5. เฉลย/แนวคำตอบ คำตอบที่ : 3.จมูกไม่ได้กลิ่น

แบบฟอร์มการสร้างแบบทดสอบประเมินความฉลาดรู้ด้านการอ่าน

กระบวนการอ่าน: การบูรณาการและตีความ

สถานการณ์: บริบทการอ่านเพื่อการศึกษา

แหล่งที่มา: เนื้อเรื่องเดียว

รูปแบบของเนื้อเรื่อง: แบบต่อเนื่อง

ประเภทของเนื้อเรื่อง: บอกเล่าอธิบายเหตุผล

ลักษณะข้อสอบ: แบบเลือกตอบ

ความสอดคล้องตัวชี้วัด: ท 1.1, ม. 1/2: จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน

คำถามที่ 2 แบบเลือกตอบเชิงซ้อน (อย่างน้อย 1 คำถาม)

ไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสส่งผลต่อการทำงานของตับ

ตอบ จริง

เฉลย/แนวคำตอบ คำตอบที่ : จริง

กระบวนการอ่าน: การบูรณาการและตีความ

สถานการณ์: บริบทการอ่านเพื่อการศึกษา

แหล่งที่มา: เนื้อเรื่องเดียว

รูปแบบของเนื้อเรื่อง: แบบต่อเนื่อง

ประเภทของเนื้อเรื่อง: บอกเล่าอธิบายเหตุผล

ลักษณะข้อสอบ: แบบเลือกตอบเชิงซ้อน

ความสอดคล้องตัวชี้วัด: ท 1.1, ม. 1/2: จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน

คำถามที่ 3 แบบเติมคำตอบแบบปิด (อย่างน้อย 1 คำถาม)

ข้อความ	ลำดับเหตุการณ์
1. มีอาการเลือดออก ถ่ายดำ อาเจียน มีจุดเลือดออกตามตัว	3
2. ได้รับเชื้อไวรัสของไข้เลือดออกจากยุงลาย	1
3. ไข้สูงลอย 39-40 องศา 4-5 วัน	2

เฉลย/แนวคำตอบ คำตอบที่ : 3 1 2

กระบวนการอ่าน: การบูรณาการและตีความ

สถานการณ์: บริบทการอ่านเพื่อการศึกษา

แหล่งที่มา: เนื้อเรื่องเดียว

รูปแบบของเนื้อเรื่อง: แบบต่อเนื่อง

ประเภทของเนื้อเรื่อง: บอกเล่าอธิบายเหตุผล

ลักษณะข้อสอบ: เติมคำตอบ

ความสอดคล้องตัวชี้วัด: ท 1.1, ม. 1/2: จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน

แบบฟอร์มการสร้างแบบทดสอบประเมินความฉลาดรู้ด้านการอ่าน

คำถามที่ 4 แบบเติมคำตอบแบบเปิด (อย่างน้อย 1 คำถาม)

เพราะเหตุใดการระบาดของเชื้อไข้เลือดออกในแต่ละปีมักน้อยแตกต่างกัน

- คำตอบ เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อน้อย ภูมิคุ้มกันจึงมีน้อย และมีกิจกรรมทางสังคมในแต่ละปีต่างกัน

เฉลย/แนวคำตอบ คำตอบที่ : เนื่องจาก มีผู้ติดเชื้อน้อย ภูมิคุ้มกันจึงมีน้อย และมีกิจกรรมทางสังคมในแต่ละปีต่างกัน

กระบวนการอ่าน: การบูรณาการและตีความ

สถานการณ์: บริบทการอ่านเพื่อการศึกษา

แหล่งที่มา: เนื้อเรื่องเดียว

รูปแบบของเนื้อเรื่อง: แบบต่อเนื่อง

ประเภทของเนื้อเรื่อง: บอกเล่าอธิบายเหตุผล

ลักษณะข้อสอบ: เติมคำตอบตอบเชิงซ้อน

ความสอดคล้องตัวชี้วัด: ท 1.1, ม. 1/2: จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน

คำถามที่ 5 แบบเติมคำตอบแบบอิสระ (อย่างน้อย 1 คำถาม)

นักเรียนคิดว่า เราสามารถป้องกันเชื้อไข้เลือดออกได้อย่างไร

- คำตอบ ควบคุมสิ่งแวดล้อมเพื่อไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย ใส่เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ใช้สารเคมีควบคุม ใช้ทรายอะเบท ใช้ยามาลูกน้ำใส่ในบ่อน้ำ ใช้สารเคมีพ่นตามบ้านเพื่อฆ่ายุงลาย

เฉลย/แนวคำตอบ คำตอบที่ : ควบคุมสิ่งแวดล้อมเพื่อไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย ใส่เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว

ใช้สารเคมีควบคุม ใช้ทรายอะเบท ใช้ยามาลูกน้ำใส่ในบ่อน้ำ ใช้สารเคมีพ่นตามบ้านเพื่อฆ่ายุงลาย

กระบวนการอ่าน: การบูรณาการและตีความ

สถานการณ์: บริบทการอ่านเพื่อการศึกษา

แหล่งที่มา: เนื้อเรื่องเดียว

รูปแบบของเนื้อเรื่อง: แบบต่อเนื่อง

ประเภทของเนื้อเรื่อง: บอกเล่าอธิบายเหตุผล

ลักษณะข้อสอบ: เติมคำตอบ

ความสอดคล้องตัวชี้วัด: ท 1.1, ม. 1/2: จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน